

Influencia de la pandemia Covid-19 en la adherencia a la vacunación antigripal en trabajadores sanitarios.

**ENFERMERÍA
DEL TRABAJO**

360°

**II CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS
EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO**

**13 JORNADA DE LA AET
8ª JORNADA DE ACITSL**

DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2024

 **Col·legi Oficial d'Infermeres i
Infermers de Barcelona**

Emilia Galindo López. H.U.TORRECÁRDENAS.

emilia.galindo.lopez.sspa@juntadeandalucia.es

UN POCO DE HISTORIA



1918 Hospital estadounidense.Fort Riley



INTRODUCCIÓN

GRIPE

- ❑ Enfermedad inmunoprevenible más frecuente en los países desarrollados.
- ❑ Afecta al **10-20 %** de la población mundial **cada año**.
- ❑ La vacunación puede reducir el 80% de **hospitalizaciones** por neumonía en > 65 años y un 22% la **mortalidad** en >75 años

GRUPO PRIORITARIO DE VACUNACIÓN,
mayor posibilidad de infectarse y transmitir el virus:

Profesionales sanitarios



Centro Internacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. SVGE.






LA VACUNACIÓN ES LA MEDIDA PRINCIPAL PARA EVITAR SU DIFUSIÓN

OBJETIVOS DE VACUNACIÓN EN ESPAÑA PARA PROFESIONALES SANITARIOS

CAMPAÑA 2019/2020 **40%**

CAMPAÑA 2020/2021 **75%**



ALTA RESISTENCIA A LA VACUNACION EN EL PERSONAL SANITARIO

Cobertura de vacunación: España < 35%, Europa 5%-54,9%, EEUU 78,4%-94,8%




COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa, producida por el **virus SARS-CoV-2**, que produjo 3.937.192 casos confirmados en España, **184.820.132 casos confirmados en el mundo**. MINISTERIO SANIDAD, 10/07/2021.



PRIMERAS DOSIS VACUNA COVID-19
26 DICIEMBRE DE 2020



PROGRAMAS VACUNACIÓN






Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece las obligaciones de la empresa para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo

R.D. 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, establece que deberá informarse a los trabajadores de las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación.

No existe la obligatoriedad de la vacunación en profesionales sanitarios



OBJETIVOS

-  **Evaluar si la pandemia Covid-19 había influido en la decisión de los trabajadores para vacunarse frente a la gripe.**
-  **Identificar factores asociados a la aceptación de la vacunación de la gripe.**
-  **Establecer la prevalencia de profesionales vacunados en las campañas 2019/2020 y 2020/2021.**



MATERIAL Y MÉTODO

ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL

VARIABLES: edad, sexo, servicio hospitalario, categoría profesional, patologías crónicas, vacunación antigripal campañas 2019/20 y 2020/21, vacunación SARS-CoV-2, motivación para vacunarse o no y posibles efectos adversos

POBLACIÓN DE ESTUDIO 4048 TRABAJADORES
Profesionales sanitarios y no sanitarios

CUESTIONARIO AUTOADMINISTRADO 372

TAMAÑO MUESTRAL 351 (IC 95%)

Nivel de significación estadística $p < 0,05$



Tratamiento estadístico de los datos SPSS V.26





RESULTADOS


EDAD MEDIA: 43,85 años.
MÍNIMO: 19 años. MÁXIMO: 64 años.

CATEGORÍA PROFESIONAL






DISTRIBUCIÓN por ÁREAS DE TRABAJO



VACUNADOS GRIPE 2020/2021 por CATEGORÍAS



VACUNADOS GRIPE 2020/2021



MOTIVACIONES


SÍ




NO



VACUNADOS GRIPE POR CAMPAÑAS QUE SUELEN VACUNARSE TODOS LOS AÑOS





HABERSE VACUNADO CON ANTERIORIDAD supone un **INCENTIVO**

El **57,1%** de los vacunados en la campaña **2019/2020** se vacunaron en la campaña siguiente.





CONCLUSIONES

- La pandemia COVID-19 **HA INFLUIDO POSITIVAMENTE** en la decisión de vacunarse contra la gripe en los que se vacunaron por primera vez, amentando el porcentaje de profesionales vacunados respecto a la temporada anterior.
- El trabajar en áreas Covid-19 respecto a no Covid-19 no ha supuesto diferencias para la decisión de vacunación antigripal, por tanto, **PARECE NO HABER UNA PERCEPCIÓN DIFERENTE SOBRE EL RIESGO** de coinfección y de la gravedad de la enfermedad cuando se está expuestos en un entorno de alto riesgo a Covid-19.
- En nuestro estudio se han encontrado diferencias significativas de vacunación según las **CATEGORÍAS PROFESIONALES**, los colectivos profesionales tienen diferentes apreciaciones del problema.



CONCLUSIONES



Campaña gripe 2020/2021



BIBLIOGRAFÍA





¡Muchas gracias!



II CONGRESO INTERNACIONAL
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

BARCELONA 2024
15, 16 Y 17 DE FEBRERO